

Maladies virales

Maladies bactériennes

Maladie	Symptômes	Traitement	Prévention	Maladie	Symptômes	Traitement	Prévention
L'hépatite contagieuse ou maladie de Rubarth	Diminution de l'appétit, fièvre, muqueuses pâles, conjonctivite, toux, douleurs abdominales, vomissements et diarrhée.	Le traitement spécifique est la sérothérapie, qui reste efficace seulement durant les 48 premières heures de la maladie.	L'isolement de l'animal infecté.	La tuberculose :	Perte de poids, diarrhée, constipation, toux et respiration discordantes et des symptômes locaux selon le foyer tuberculeux.	La mort survient quelques mois après l'infection. Le traitement est hasardeux et dangereux, l'animal atteint doit être euthanasié rapidement.	
Provoquée par un adénovirus, cette maladie se transmet par simple contact (léchage, nez à nez, chienne allaitante) ou par contact indirect (objets ou aliments souillés).				Causée par la Mycobactérium bovis, transmise par les aérosols, sécrétions diverses, lésions cutanées. Maladie zoonose.			
Maladie de carré	Symptômes respiratoires, digestifs, cutanés, oculaires et nerveux.	Il n'y a pas de traitement spécifique, une hospitalisation est souvent nécessaire pour réduire les troubles digestifs, respiratoires et nerveux.	Etablir deux semaines de mise en quarantaine avant d'introduire un nouvel animal dans un groupe de chiens sains.	Le tétanos	Spasmes musculaires, incapacité à se tenir à 4 pattes, contracture des muscles faciaux (aspect « rire sardonique »).	L'administration de tranquillisants est conseillée. Si la maladie est détectée dans un laps de temps réduit, une sérothérapie s'avérera efficace.	Utilisation régulière d'un antiparasitaire (contre les puces).
Due à un virus de genre Morbillivirus, proche de celui la rougeole. Sa contagion se fait de chien à chien (léchage, contact nez à nez).				Provoqué par le Clostridium, cette maladie rare est redoutée. Elle touche le système nerveux du chien.			
La Parovirose canine	La forme gastrique : fatigue, perte d'appétit, avec ou sans fièvre. Puis des vomissements, diarrhées et déshydratation. La forme myocardique : pas de signe, la mort peut survenir par un choc aigu.	Il n'existe pas de traitement à ce jour. Le vétérinaire peut administrer un traitement symptomatique mais la mort se produit le plus souvent.	Une hygiène rigoureuse. La vaccination dès l'Âge de 8 semaines.	La leptospirose	Gastro-entérites hémorragiques, des néphrites avec urémie, (inflammation des reins), voire la jaunisse.	Un traitement antibiotiques, qui peuvent être efficaces si administrés à temps.	L'hygiène sanitaire.
Il s'agit d'un parvovirus canin, qui touche le plus souvent les chiots. Elle se transmet par le contact nasal ou buccal des matières fécales des chiens infectés.				Due à des bactéries dites spirochètes, ce sont les rongeurs qui transmettent cette maladie aux chiens par l'urine, en contact avec leur urine infectée, en la buvant ou en nageant dedans. Maladie zoonose.			
Le toux du Chenil	Caractérisée par des troubles respiratoires accompagnés d'une toux grasse ou sèche. Larmolement, écoulement nasal.	Traitement par anti-tussif, anti-inflammatoires, antibiotiques.	Les animaux malades doivent être isolés ainsi que les locaux nettoyés. La vaccination.	Les Otites :	Douleur, œdème, rougeur et chaleur. Selon le type d'otite, les sécrétions peuvent être brun clair à noir accompagnées de démangeaisons.	Traitement locaux avec liquide (gouttes) instillé dans les oreilles (nettoyant, antibiotiques, des comprimés et du lait dermatologique pour le pavillon.	Usage régulier de produits d'hygiène spécifiques dans les conduits auditifs pour éliminer tout parasite.
Composé de plusieurs virus, elle est très contagieuse car se transmet par voie aérienne. Cependant, elle n'est pas dangereuse pour un animal en bonne condition physique.				Cette inflammation du pavillon de l'oreil ou du conduit auditif, peut toucher une ou les deux oreilles. Il y a différents types d'otites : parasitaires, bactériennes, allergiques.			
La Rage :	La rage furieuse : agitation, morsure, mal à saliver, puis paralysie.	Il est possible de vacciner le chien avant le début des symptômes. Après, il n'existe pas de traitement de la maladie.	La vaccination reste la seule protection, elle est obligatoire et fondamentale.	Les Infections cutanées :	Inflammation cutanée et démangeaison, perte de poil, pelage terne, taches rouges, pus, pustule, croûtes.	Traitement spécifique des lésions cutanées initiales (soins). Traitement de l'infection bactérienne secondaire (corticoïdes, antihistaminiques).	
Provenant d'un virus de la famille des rhabdoviridés, transmet généralement par morsure. Il y a deux types de rage : la rage furieuse et la rage paralytique.				Plaques enflammées, purulentes et avec croûtes. Elles entraînent la chute des poils.			

Maladies parasitaires

Ce sont les maladies causées le plus souvent par les tiques. Elles s'attrapent dans les buissons, les haies, l'herbe ou les broussailles. Mais aussi de chien à chien. Une tique peut sauter et courir.

Maladie	Symptômes	Traitement	Prévention
La piroplasmose	Refus de se nourrir, forte fièvre, vomissement, urine anormale.	Injections détruisant le parasite, perfusions pour réhydraté, transfusions sanguine	Le port de collier anti-puce, les pulvérisateurs, les pipettes. La vaccination.
Ce parasite détruit les globules rouges, c'est l'une des maladies parasitaires les plus fréquentes. Elle peut être mortelle.			
La maladie de Lyme	Fièvre récurrente, abattements, anorexie, respiration haletante. Mais aussi douleurs musculaire/articulaire.	Un traitement antibiotique, une sérologie.	Produits contre les tiques.
Due à Borrelia Burgdorferi, une bactérie provenant des tiques.			
La spirocerose	Amaigrissement, anémie, symptômes digestifs et respiratoires voir nerveux.	Un traitement délicats avec des médicaments pour bovins. Mais l'évolution est souvent fatale.	L'hygiène, la prudence.
Causé par le parasite spirocerca lupi, cette maladie se transmet en mangeant les excréments d'animaux malades.			
La leishmaniose	Amaigrissement, ulcération de la truffe, ganglion, lésion oculaire, yeux et nez croûteux, pousse des ongles.	Traitement par injection (glucantime) associé à la prise de comprimés par une voie orale.	Produits répulsifs pour le phlébotome (colliers, pipettes ou sprays. La prudence, les insecticides. La vaccination.
Provient d'un moustique, le phébotome. Cette maladie grave est une zoonose.			